




## بسمه تعالی تومور ویلمرز



کد سند: ENO-PE-12

شماره بازنگری: A

شماره بیمارستان: 081-38272970

پاییز 1403

گروه هدف: والدین/همراهان  
تحت نظارت: واحد آموزش به بیمار

8) بعد از اتمام دوره شیمی درمانی پیگیری های لازم و دوره ای را حتماً با پزشک مربوطه انجام دهید.

9) به یاد داشته باشید دعا و اعتقادات مذهبی جهت تسکین و قوت قلب بسیار مفید میباشد.

10) بیماری ها نتیجه گناهان و قصور والدین نمی باشد و ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد سعی کنید با توکل به خداوند اقدامات درمانی را بطور صحیح و به موقع انجام داده تا بهبودی کامل برای فرزند شما حاصل گردد.

به امید شفای همه ی بیماران

منبع: درسنامه پرستاری داخلی جراحی

برونر خون شناسی ۲۰۱۴

## آموزش به والدین:

- 1) خونسردی خود را حفظ کنید تا بتوانید تمرکز کنید تصمیم گیری صحیح انجام دهید.
- 2) سعی کنید نسبت به بیماری و وضعیت کودک خود به باور صحیح برسید و از مقایسه با دیگر بیماران پرهیزید چراکه هر بیمار شرایط خاص خود را دارد.
- 3) تا قبل از انجام جراحی مواظب باشید شکم بیمار محکم لمس نشود چون ممکن است باعث پارگی و پخش تومور شود.
- 4) اگر در درجات ابتدایی بیماری تشخیص داده شود تا بالای ۹۶ درست شانی بهبودی وجود دارد. بنابراین در پی برای درمان بیماری کوشا باشید.
- 5) شیمی درمانی صحن درمان بیماری دارای عوارض مخصوص به خود هم میباشد که با آموزش و کمک پرستار می تواند شدت آنها را به حداقل رساند.
- 6) به یاد داشته باشید خونریزی و تب دو عارضه مهم بعد از شیمی درمانی هستند که می بایست حتماً به پزشک اطلاع دهید.
- 8) مصرف مایعات خوراکی و تزریقی در کاهش عوارض داروهای شیمی درمانی که برای این تومور استفاده میشود مهم می باشد.

## تعریف :

تومور ویلمز شایع ترین تومور کلیه در سن کودکی می باشد و به نام کاشف آن مارکس ویلمز جراح آلمانی نامیده شده است. در بین دختران و پسران برابر اتفاق می افتد میانگین سنی ابتلا به این بیماری ۳ سالگی می باشد و ۷۵ درصد موارد زیر سن ۵ سالگی اتفاق می افتد.



## تومور ویلمز چرا به وجود میاید؟

علت اصلی این بیماری به درستی شناخته نشده است اما مسائل ژنتیکی و غیر ژنتیکی در ایجاد بیماری میتوانند نقش داشته باشند. مسائل ژنتیکی ممکن است بصورت ژن جهش یافته از والدین به ارث برسد یا طی تماس کودک با مواد جهش زا اتفاق بیفتد. مسائل غیر ژنتیکی شامل سن بالای والدین و اشتغال والدین در صنعت آهن و وزن بالای هنگام تولد می باشد.

## علائم بیماری چیست؟

در ابتدا این تومور بدون علامت بوده که با بزرگ شدن تومور به تدریج بزرگ شدن شکم، شکم درد بی اشتهاپی و گاهی بالا رفتن فشار خون، ادرار خونی، خواب آلودگی، رنگ پریدگی ممکن است مشاهده شود این تومور در مشاهده در قسمت بالای شکم و یکطرفه ممکن است هنگام حمام دادن بچه توسط والدین یا معاینه دقیق توسط پزشک اطفال بطور اتفاقی کشف شود.

## تشخیص قطعی:

تشخیص قطعی بعد از مشاهده علائم و معاینه بالینی با انجام سی تی اسکن و جراحی تشخیصی انجام میشود که همزمان با ارسال نمونه برداری از تومور ممکن است جراحی جنبه درمانی هم داشته باشد و تمامی توده و کلیه توسط جراح خارج شود که بستگی به وضعیت توده و صلاحدید جراح انجام میشود.

## درجه بندی تومور چگونه انجام میشود:

تومور در هنگام تشخیص ممکن است پیشرفته یا در مراحل ابتدایی باشد مرحله بندی بیماری از نظر وسعت پیشرفت بیماری بررسی می شود. اگر تومور محدود به داخل کلیه باشد مرحله یک اگر تومور بافت خارج کلیه را نیز درگیر کرده باشد درجه دو اگر غدد لنفاوی اطراف تومور هم درگیر باشد درجه سه اگر تومور به بافت های دور توکل کبد ریه و روده هم سرایت کرده باشد درجه کار را رقم میزند که معمولاً ناشی از عدم تشخیص به موقع یا سهل انگاری در مراجعه به پزشک و پیگیری درمان بیماری می باشد. مرحله پنجم درگیری دو طرفه کلیه را نشان می دهد که اغلب با بیماریهای ارثی و ژنتیکی همراه است.

## درمان بیماری :

معمولاً تومور توسط جراح بطور کامل برداشته میشود که قسمت عمده درمان است شیمی درمانی نیز به عنوان درمان تکمیلی و پیشگیرانه از برگشت دوباره تومور لازم می باشد. رادیوتراپی گاهی ممکن است با تشخیص پزشک انجام شود لازم باشد.